

Allgemeine Brut-Informationen

Sorte: Brut:

Sorte:	Ziege
Brut-Name/Belastung:	Djallonke



Allgemeiner Name/Synonym: Afrikanischer Westzweig, afrikanischer Pygmy, afrikanischer Zwerg, Chevre de Fouta Djallon, Guinean, Guinean Zwerg, Chevre guineene; Cameroon Zwerg, Ghana Zwerg, Ghana Wald, Waldzweig, nigerischer Zwerg, Wiese-Zwerg, der Kongo Zwerg; Chevre Naine, Chevre de Casamance, Hausa, Kosi, Mossi, Cameroon Wiese, Kirdi, Kirdimi; Mayo-Kebbi (in Tschad).

Brut-Gruppe Name: Short-eared Klein-gehörntes

Untergruppe-Informationen:

Kleine afrikanische Fleisch-Ziege

Gruppe Ursprung:

Hausziegen mit scimitar-wie Hornen werden betrachtet, von der Bezoar Ziege (*Capra hircus aegargus*) im Südwesten Asien abgestiegen zu sein, in dem die wilde Form noch besteht. Die Zeit von Zähmung war vor 7000 BC um die Ränder des heutigen Irans und des Iraks. Ziegen hatten Ägypten bis zum dem 5. Jahrtausend BC erreicht und die kleine short-eared, SABRE-gehörnte, generalisierte Art wurde gelegentlich auf den Grabenstrichen des 4. Jahrtausends veranschaulicht. Es scheint daß, wie diese Arten der Ziegen stufenweise in Ägypten durch Ziegen mit Spirale- oder Korkenzieherhornen ersetzt wurden, die ursprünglich Ägypten vom Osten über 3500 BC gekommen hatten. Jedoch behielten die short-eared und kurz-gehörnten Ziegen ihre Anwesenheit im äquatorialen West-, in der Zentrale und im Ostafrika bei. Im feuchten und heißen Klima von West- und Zentralafrika, neigen die heutigen Ziegen dieser Art, zwergartig zu sein, die geglaubt wird, um an der natürlichen Vorwähler auf Wärmeregulierung unter dem ungünstigen feuchten und heißen Klima zu liegen. Zusätzlich hat die afrikanische zwergartige Westziege häufig die kurzen gebeugten Beine, die achondroplasia zugeschrieben werden. Es ist möglich, daß diese Eigenschaft absichtlich für von Inhaber gerade für seinen Oddness vorgewählt wurde. Die Verteilung dieser Ziegeart verlängert southwards durch Zentralafrika bis zu Zaire, Angola und dem Norden von Namibia (Mason, 1984).

Brut-Ursprung:

Diese Ziegeart ist achondroplastic Zwerg mit Mangel an Verknöcherung an den Knorpelverbindungen; sie entwickelten vermutlich spezifisch in Erwidern auf die Bedingungen der feuchten Waldzone durch Vorwähler der rückläufigen Gene für dwarfism (Wilson, 1991).

Hauptposition:

Die zutreffende Art dieser Ziege wird betrachtet, auf 15 Ländern in West- und Zentralafrika begrenzt zu werden, das ausgenommen die Republik Zentralafrika, die eine atlantische Küstenlinie hat (Guinea-Bissau, Guine, Liberia, Sierra Leone, Cote d' Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Cameroon, der Kongo, äquatoriale Guine, Gabun, Zaire, Republik Zentralafrika); auch gefunden in Senegal; eine experimentelle Menge wird an der Wageningen Universität in den Niederlanden beibehalten; es gibt viele, die als Haustiere und in den Zoos in den USA gehalten werden, in denen sie als afrikanischer Pygmy bekannt, für den es eine Brutgesellschaft gibt; die Gesamtbevölkerung in Westafrika ist vermutlich ungefähr 16 Million; im Wesentlichen pro Jahr begrenzt auf den feuchten Waldzonen mit mehr als 240 wachsenden Tagen und über 1500 Millimeter Niederschlag; die meisten dieser Zone wird mit tsetse Fliege geplagt und trypanosome Infektion ist überwiegend; die Produktion Systeme sind landwirtschaftlich peri-städtisch, und in geringerem Ausmass Landwirtschafts-Schäfer mit vielen ethnischen Gruppen (Wilson, 1991).

Lebensraum:

Spezielle Eigenschaft:

Mit Höhe von nur 30 bis 50 Zentimeter deutlich in den Schatten stellen; Männer wiegen 20-25 Kilogramm und Frauen 18-22 Kilogramm; starker Kopf und ausbauchende Stirn; Hauptprofil wird gerade oder etwas angerichtet; schmale Mündung mit dem untereren Kiefer etwas länger als Upper; Horne kräuseln sich außerhalb und rückwärts in den Männern und sind Licht, scharf und in Frauen aufwärts und rückwärts zeigen; Ohren sind zum Mittel in der Länge kurz und werden horizontal getragen; Knebel gelegentlich vorhanden in beiden Geschlechtern; Männer normalerweise bärtig und mit einer schwachen Mähne; Frauen haben gelegentlich Bärte; Herzgurt ist viel grösser als Höhe an den Widerristen; Rückseite ist gerade und lang; croup gut entwickelt; Euter klein aber normalerweise gut entwickelt; Farbe ist entsprechend Region sehr variabel, dunkles Braun mit den schwarzen allgemeinsten Punkten vielleicht, aber Schwarz-, Weiß-, Rot-, gescheckte und Mischfarben treten auch auf; Mantelhaar ist kurz und normalerweise steif, aber einige Formationsglieder haben wellenförmiges langes Haar; mehr